



D2 - Bloemenmengsel voor ecologische dakbegroeiing

Zonnige plek

Overwegend droge grond

Gem. 15 cm

Bloeitijd maart-november

Jaarlijks max. 1 maaien & afvoeren

Bijen & vlinders

Bloei vanaf het 2^e jaar

Permanente invulling

Substraatdikte minimaal 10 cm
Geschikt voor tuin en bebouwde kom

Karakter

In de stad van de toekomst zijn groene daken niet weg te denken. Ze zorgen voor wateropvang en afkoeling van de leefomgeving. In vergelijking met sedumdaken dragen kruidendaken veel meer bij aan de biodiversiteit. Naast nectar, biedt dit mengsel planten die van belang zijn als waardplant voor vlinders, zoals Schapenzuring en Gewone rolklaver. Afhankelijk van het beschikbare vocht kunt u na één tot anderhalf jaar een bloemrijk resultaat verwachten.

Grondsoort

Het mengsel is zorgvuldig samengesteld voor het extreme klimaat dat op daken heerst. Wel hebben kruiden meer vocht nodig dan sedumsoorten, waardoor je een dikkere substraatlaag nodig hebt die genoeg vocht en voedingsstoffen vasthoudt. Wij adviseren substraatdiktes van minimaal 10, maar liever 15 cm of meer.

Zaaidichtheid

Gemiddeld 3 g/m² voor een bloemrijk resultaat, mits niet beregend.

Zaaiperiode

Jaarrond, bij voorkeur eind juli - oktober of februari - half april.

Beheer

Afhankelijk van de substraatdikte en hoogte van de plantengroei eventueel in de herfst te maaien (gefaseerd) en het maaisel af te voeren.

Toepassingsmogelijkheden

Tuinen, openbare ruimte binnen de bebouwde kom (daken, open bestrating).



Meer weten of bestellen?



Soortenlijst D2-mengsel

| | |
|---|--------------------|
| <i>Achillea millefolium</i> | Duizendblad |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | Bieslook |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | Wondklaver |
| <i>Armeria maritima</i> | Engels gras |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | Grasklokje |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Borstelkrans |
| <i>Dianthus armeria</i> | Ruige anjer |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | Kartuizer anjer |
| <i>Dianthus deltoides</i> | Steenanjer |
| <i>Erigeron acris</i> | Scherpe fijnstraal |
| <i>Erodium cicutarium</i> | Gewone reigersbek |
| <i>Galium verum</i> | Geel walstro |
| <i>Jasione montana</i> | Zandblauwtje |
| <i>Linaria vulgaris</i> | Vlasbekje |
| <i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i> | Gewone rolklaver |
| <i>Origanum vulgare</i> | Wilde marjolein |
| <i>Papaver dubium</i> | Bleke klaproos |
| <i>Pilosella officinarum</i> | Muizenootje |
| <i>Plantago media</i> | Ruige weegbree |
| <i>Potentilla argentea</i> | Viltganzerik |
| <i>Potentilla verna</i> | Voorjaarsganzerik |
| <i>Prunella vulgaris</i> | Gewone brunel |
| <i>Rumex acetosella</i> | Schapenzuring |
| <i>Sedum acre</i> | Muurpeper |
| <i>Sedum album</i> | Wit vetkruid |
| <i>Sedum rupestre</i> | Tripmadam |
| <i>Silene vulgaris</i> | Blaassilene |
| <i>Thymus pulegioides</i> | Grote tijm |
| <i>Trifolium arvense</i> | Hazenpootje |